

Varietates hujus speciei duæ evidentissimæ.

α *Stipulis subrotundis obtusissimis retusis.*

Floribus in spica sæpius alternis magis pedicellatis.

β *Stipulis ovato-oblongis acutiusculis.*

Floribus tribus in singulo spicæ verticillo.

Bracteis triphyllis scapum spicæ ambientibus.

トアリ共ニ Kamtschatka 産ノモノデアル。ソレニモ拘ハラズ後ニハ至ツテ PALLAS 氏ハ 'Species Astrogaleorum' (1800) ニ於テ α 形ヲ自身ノ *Sophora fabacea* PALLAS (*Thermopsis fabacea* DE CANDOLLE ノ原異名) ニ當テ、β 形ノ方ニ *Sophora lupinoides* LINNÆUS ナル名ヲ殘シタ。而モ其際氏ガ β ト思ツテ圖解シタ植物ハ *Thermopsis lanceolata* R. BROWN デアツテ眞ノ LINNÆUS 氏命名ノ β 形植物トハ全ク違ツタモノデアツタ。コレガ諸々ノ誤リノ元デアツテ上記 FEDTSCHENKO 氏ナドモコノ誤リニ知ラズ識ラズ陷ツテキル一人デアル。LINNÆUS 氏ノ記載ヲヨク吟味スレバ α, β 兩形ハ單ニせんだいはぎノ個體差ニ用キラレタ區別デアルコトガ明ラカデ大シテ問題トスルニハ當ラナイ。サスレバ結論トシテせんだいはぎノ學名ハ最モ古イ *Sophora lupinoides* ヲ訂正シタ *Thermopsis lupinoides* LINK (Enum. Hort. Berol. I p. 401 (1821)) デアリ *Thermopsis fabacea* DE CANDOLLE (Prodr. II p. 99 (1825)) ハ異名トセネバナラスコトニナル。又一方ほそばせんだいはぎノ名ハ從來最モヨク用キラレテキル *Thermopsis lanceolata* R. BROWN (in AITON, Hort. Kew. ed. 2 III p. 3 (1811)) ノ儘デヨイコトニナル。後者ハ中央アジア、シベリヤ、蒙古、北支那、滿洲等ノ内陸ノアルカリ性砂地ニ分布スル種デアリ牧草トシテハ價值ノ薄イモノデアル。

〇いははぜ (あかもの) ノ綠白花品 (本田正次)

本年7月、八甲田山ニ行ツタ際、東北帝大吉井義次教授カラ同山ノ産トシテ高山植物園内ニ栽培シテアルいははぜ (一名あかもの) ノ變リ品ヲ見セラレタ。見レバいははぜノ普通品ニ見ル所ノ萼、花冠、花柱、花梗、苞等ノ紅色ガ少シモナクテ全部淡綠色ヲ呈シ、萼ヤ花梗ニ生ズル腺毛マデガ白色ヲ呈シテ居ルカラ、明カニ普通品ト區別スルコトガ出來ル。學名ハ吉井教授ヲ紀念シテ *Diplycosia adenothrix* var. *Yosiana* HONDA ト命ズルガ、和名ハしろあかものデモ可笑シイカラしろいははぜトシタイ。

Diplycosia adenothrix NAKAI var. *Yosiana* HONDA, var. nov.

Omnes partes viridescences, nec rufescentes. Pili glandulosi albi.

Nom. Nipp. *Siro-iwahaze* (nov.)

Hab.

Honsyū: in monte Hakkōda, prov. Mutu (Y. YOSHI, anno 1939—typus in Herb.

Imp. Univ. Tokyo.)

Planta endemica.

(M. HONDA)